

สถานการณ์ไข้เลือดออกในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙ พบว่ามีนักศึกษาป่วยเป็นไข้เลือดออก จำนวน ๘ ราย ดังนั้นหากมีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออก ทั้งนักศึกษา บุคลากร และครอบครัวบุคลากร ที่อาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ขอให้แจ้งข้อมูลการเจ็บป่วยมาที่ งานบริการสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา เพื่อดำเนินการควบคุมโรค โทร ๐๗๕-๖๗๓๑๒๒-๔ เบอร์โทรภายใน ๓๑๒๒-๔

ไข้เลือดออก ระบาด เพียงแค่ยุ่งลยาก็อาจถึงตายได้

อาการโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกสามารถสังเกตอาการได้หากมีอาการดังต่อไปนี้ควรรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันอาการช็อกและเสียชีวิตได้

๑. มีไข้มากกว่า 37.5 c เมื่อเช็ดตัวและรับประทานยาลดไข้แล้วไข้ยังไม่ลด นาน 2-3 วัน
๒. มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร
๓. หน้าแดง ตัวแดง
๔. ปวดเมื่อยตามร่างกาย

5ป : วิธีป้องกันตนเองจากไข้เลือดออก

ปิด	ปิดฝาภาชนะให้สนิท
ปล่อย	ปล่อยปลากินลูกน้ำ
ปรับ	ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ยุง
เปลี่ยน	เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้ทุก ๗ วัน
ปฏิบัติ	ปฏิบัติเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

ไข้เลือดออกหยุดได้ถ้าเราร่วมมือกัน ด้วยมาตรการ 3 เก็บ

เก็บบ้าน	เก็บบ้าน/หอพัก ให้ปลอดโปร่งเพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก
เก็บขยะ	เก็บขยะ เศษภาชนะที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้
เก็บน้ำ	เก็บน้ำให้มิดชิดปิดฝาภาชนะ ภาชนะที่ปิดฝาไม่ได้ก็ให้ปล่อยน้ำทิ้งหรือเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือปล่อยปลาหางนกยูงกินลูกน้ำ